


ATLAS
DE LA
FLORE ALPINE.

Tome. IV.

QK315

.C58

t.4






ATLAS

DE LA

FLORE ALPINE

*Publié par le Club alpin allemand
et autrichien.*

Tome IV (Planches 301 à 400).



LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

GENÈVE & BALE
LIBRAIRIE GEORG & Co

Lyon, même maison.

1899

Tous droits réservés.

.C56
t. 4

Index des planches du tome IV.

(Planches 301 à 400.)

Les plantes dont les noms sont accompagnés d'un * sont photographiées d'après nature.

- | | |
|---|---|
| 301. <i>Calluna vulgaris</i> Salisb. | 351. <i>Gentiana obtusifolia</i> Wild.* |
| 302. <i>Erica carnea</i> L. | 352. » <i>ciliata</i> L.* |
| 303. <i>Loiseleuria procumbens</i> Desv.* | 353. » <i>verna</i> L.* |
| 304. <i>Rhododendron Chamaecistus</i> L. | 354. » <i>Favrati</i> Rittener.* |
| 305. » <i>hirsutum</i> L.* | 355. » <i>imbricata</i> Frœl.* |
| 306. » <i>ferrugineum</i> L.* | 356. » <i>bavarica</i> L.* |
| 307. <i>Pyrola uniflora</i> L. | 357. » <i>pumila</i> Jacq.* |
| 308. <i>Armeria alpina</i> Wild. | 358. <i>Pleurogyne carinthiaca</i> Gris. |
| 309. <i>Primula Auricula</i> L.* | 359. <i>Swertia perennis</i> L.* |
| 310. » <i>carniolica</i> Jacq. | 360. <i>Polemonium coeruleum</i> L. |
| 311. » <i>latifolia</i> Lap.* | 361. <i>Eritrichium nanum</i> Schrad.* |
| 312. » <i>cenensis</i> Thom.* | 362. <i>Pulmonaria styriaca</i> A. Kern.* |
| 313. » <i>viscosa</i> Vill. | 363. <i>Myosotis alpestris</i> Schmidt.* |
| 314. » <i>villosa</i> Jacq.* | 364. <i>Cerinthe alpina</i> Kit. |
| 315. » <i>Wulfeniana</i> Schott.* | 365. <i>Scopolia carniolica</i> Jacq.* |
| 316. » <i>Clusiana</i> Tausch.* | 366. <i>Linaria alpina</i> Mill.* |
| 317. » <i>glutinosa</i> Wulf.* | 367. <i>Scrophularia Hoppei</i> Koch.* |
| 318. » <i>minima</i> L.* | 368. <i>Digitalis ambigua</i> Murr.* |
| 319. » <i>farinosa</i> L.* | 369. <i>Erinus alpinus</i> L.* |
| 320. » <i>longiflora</i> All.* | 370. <i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq. |
| 321. » <i>elatior</i> Jacq.* | 371. <i>Pæderota Bona Rota</i> L. |
| 322. <i>Androsace Chamaejasme</i> Host. | 372. » <i>Ageria</i> L.* |
| 323. » <i>villosa</i> L.* | 373. <i>Veronica saxatilis</i> Jacq.* |
| 324. » <i>obtusifolia</i> All.* | 374. » <i>fruticulosa</i> L.* |
| 325. » <i>lactea</i> L.* | 375. » <i>alpina</i> L. |
| 326. » <i>carnea</i> L. | 376. » <i>bellidioides</i> L.* |
| 327. » <i>vitaliana</i> Lap. | 377. » <i>aphylla</i> L.* |
| 328. » <i>Hausmanni</i> Leyb. | 378. » <i>latifolia</i> L. |
| 329. » <i>Helvetica</i> Gaud.* | 379. <i>Euphrasia salisburgensis</i> Funk.* |
| 330. » <i>imbricata</i> Lam. | 380. » <i>minima</i> Jacq.* |
| 331. » <i>glacialis</i> Hoppe.* | 381. <i>Bartschia alpina</i> L.* |
| 332. <i>Cortusa Matthioli</i> L. | 382. <i>Rhinanthus lanceolatus</i> Neilr.* |
| 333. <i>Soldanella alpina</i> L.* | 383. <i>Pedicularis rosea</i> Wulf.* |
| 334. » <i>pusilla</i> Baumg.* | 384. » <i>acaulis</i> Wulf. |
| 335. » <i>minima</i> Hoppe.* | 385. » <i>geminata</i> Port. |
| 336. <i>Cyclamen europæum</i> L.* | 386. » <i>asplenifolia</i> Floerke.* |
| 337. <i>Gentiana Clusii</i> Perr. et Song.* | 387. » <i>rostrata</i> L. |
| 338. » <i>Kochiana</i> Perr. et » * | 388. » <i>cæspitosa</i> Sieb. |
| 339. » <i>Frœlichii</i> Jan.* | 389. » <i>incarnata</i> Jacq.* |
| 340. » <i>frigida</i> Hænke.* | 390. » <i>verticillata</i> L.* |
| 341. » <i>lutea</i> L. | 391. » <i>recutita</i> L. |
| 342. » <i>purpurea</i> L. | 392. » <i>Oederi</i> Vahl. |
| 343. » <i>punctata</i> L.* | 393. » <i>elongata</i> A. Kern.* |
| 344. » <i>pannonica</i> Scop.* | 394. » <i>foliosa</i> L. |
| 345. » <i>asclepiadæa</i> L.* | 395. <i>Melanpyrum silvaticum</i> L. |
| 346. » <i>prostrata</i> Hænke. | 396. <i>Tozzia alpina</i> L.* |
| 347. » <i>utriculosa</i> L.* | 397. <i>Orobanche flava</i> Mart.* |
| 348. » <i>nivalis</i> L. | 398. <i>Pinguicula vulgaris</i> L.* |
| 349. » <i>nana</i> Wulf.* | 399. » <i>alpina</i> L.* |
| 350. » <i>tenella</i> Rottb.* | 400. <i>Globularia cordifolia</i> L. |



301. *Calluna vulgaris*, Salisb. — Besenheide.

Bruyère commune. — Common Heath.

Tourbes, landes et pentes arides des Alpes. Juillet—Octobre.





302. *Erica carnea*, L. — Rosenheide.

Bruyère rose. — Alpine Heath.

Pentes boisées et bords des torrents. Mars — Juin.





303. *Loiseleuria procumbens*, Desv. — Alpenheide.

Azalée des Alpes. — Alpine Azalea

Pentes arides et sèches des régions supérieures. Juillet — Août.



304. *Rhododendron Chamaecistus*, L. — Zwerg-Alpenrose.

Rosage faux Ciste. — Rockrose flowered *Rhododendron*.

Pentes ombragées de la région alpine et sous alpine dans les Alpes orientales. Juin — Juillet.



305. *Rhododendron hirsutum*, L. — Wimperhaarige Alpenrose.
Rosage cilié. — Ciliate *Rhododendron*.

Alpes calcaires. Juin — Août.



306. *Rhododendron ferrugineum*, L. — Rostfärbige Alpenrose.

‘ Rosage des Alpes. — Alpine Rhododendron

Alpes, surtout granitiques. Juin — Août.



307. *Pirola uniflora*, L. — Einblüthiges Wintergrün.

Pyrole uniflore. — Oneflowered Wintergreen.

Bois de la région montagneuse. Juin — Juillet.



308. *Armeria alpina*, Willd. — Alpengrasnelke.

Armérie des Alpes. — Alpine Sea Pink.

Pentes gazonnées et ensoleillées des Alpes. Juin — Août.



309. *Primula Auricula*, L. — Aurikel.

Auricule des Alpes. — Alpine Auricule.

Rôchers des Alpes calcaires dans la région alpine et sous alpine. Mai — Juillet.



310. *Primula carniolica*, Jacq. — Krainer Aurikel.

Primevère de Carniole. — Carniolian Primrose.

Fentes des rochers dans les Alpes de Carinthie et Carniole. Mai — Juin.



311. *Primula latifolia*, Lap. — Breitblättrige Primel
 Primevère à feuilles larges. — Broadleaved Primrose.

Fentes des rochers ardoisières dans les Alpes occidentales et orientales. Juin — Août.



312. *Primula oenensis*, Thom. — Inn-Primel.

Primevère de l'Inn. — Inn's Primula.

Pentes rocheuses et fraîches des Alpes orientales dans la région alpine. Juin — Juillet.



313. *Primula viscosa*, Vill. — Klebrige Primel.
Primevère visqueuse. — Viscous Primula.

Fentes des rochers granitiques des Alpes. Avril—Juillet.



314. *Primula villosa*, Jacq. — Zottige Primel.

Primevère velue. — Hairy Primula.

Fentes des rochers des Alpes orientales dans la région alpine et sous alpine. Mai—Juin.



315. *Primula Wulfeniana*, Schott. — Wulfen's Primel.

· Primevère de Wulfen. — Wulfen's Primula.


Fentes des rochers calcaires des Alpes orientales dans la région alpine. Juin — Août.



316. *Primula Clusiana*, Tausch. — Clusius' Primel.

Primevère de Clusius. — Clusius' Primula.

Fentes des rochers des Alpes orientales, sur le versant septentrional. Mai — Juillet.





317. *Primula glutinosa*, Wulf. — Blauer Speik.

Primevère glutineuse. — Glutinous Primula.

Alpes granitiques des Alpes orientales dans les rochers de la région alpine. Juin — Août.



318. *Primula minima*, L. — Zwergprimel.

Primevère minime. — Minime Primula.

Pâturages et rochers des Alpes orientales dans la région alpine. Juni — Août.



319. *Primula farinosa*, L. — Mehlprimel.
Primevère farineuse. — Bird's-eye Primrose.

Prairies et pâturages frais des Alpes. Avril — Juin.



320. *Primula longiflora*, All. — Langblumige Primel.
Primevère à longues fleurs. — Longflowered Primrose.

Prairies des Alpes granitiques (disséminé). Juin — Juillet.



321. *Primula elatior*, Jacq. — Hochstengliger Himmelschlüssel.
Primevère inodore. — Oxlip.

Bois et prairies des régions inférieures. Mai—Juillet.



322. *Androsace Chamaejasme*, Host. — Zwerg-Mannsschild.

Androsace trompeuse. — Ciliated *Androsace*.

Pâturages des Alpes calcaires dans la région alpine. Mai—Août.



323. *Androsace villosa*, L. -- Zottiger Mannsschild.

Androsace velue. — Hairy *Androsace*.

Pâturages rocheux des Alpes occidentales et orientales calcaires, dans la région alpine et sous alpine.
Juillet — Août.



324. *Androsace obtusifolia*, All. — Stumpfblättriger Mannsschild.

Androsace à feuilles obtuses. — Blunt leaved *Androsace*.

Pâturages et pentes sèches de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.



325. *Androsace lactea*, L. — Milchweisser Mannsschild.
Androsace lactée. — Milkwhite Androsace.

Pâturages rocheux des Alpes calcaires (disséminé). Juin — Août.



326. *Androsace carnea*, L. — Fleischrother Mannsschild.

Androsace carnée — Flesh coloured *Androsace*.

Pâturages des Alpes granitiques centrales et méridionales. Juillet—Août.



327. *Androsace Vitaliana*, Lap. — Goldprimel.

Androsace jaune. — Yellow *Androsace*.

es occidentales, centrales et tyroliennes sur les pentes arides de la région alpine. Juin — Juillet.



328. *Androsace Hausmanni*, Leyb. — Hausmann's Mannsschild.
Androsace de Haussmann. Hausmann's *Androsace*.

Fentes des rochers calcaires et dolomitiques des Alpes orientales (disséminée). Juillet — Aout.



329. *Androsace helvetica*, Gaud. — Schweizer Mannsschild.

Androsace Helvétique. — Swiss *Androsace*.

Fentes des rochers calcaires de la région alpine. Disséminé. Juillet — Août.



330. *Androsace imbricata*, Lam. --- Dachziegelblättriger Mannsschild.

Androsace argentée. — Silverleaved *Androsace*.

Fentes des rochers granitiques et secs de la région alpine (disséminé). Juin — Juillet.



331. *Androsace glacialis*, Hoppe. — Alpen-Mannsschild.

Androsace glaciale. — Glacial *Androsace*.

Moraines et pierriers granitiques des Alpes. Juillet — Août.



332. *Cortusa Matthioli*, L. — Heilglöckchen.

Cortuse de Matthiöle. — Alpine Sanicle.

Lieux frais des Alpes occidentales, méridionales et orientales, dans la région sous alpine.
Mai — Juillet.



333. *Soldanella alpina*, L. — Gemeines Alpenglöckchen.
Soldanelle. — Soldanella.

Pentes gazonnées et humides des Alpes. Mai — Août.



334. *Soldanella pusilla*, Baumg. — Kleines Alpenglöckchen.
Petite Soldanelle. — Little Soldanella.

Pâturages frais des Alpes orientales dans la région alpine. Juin — Août.



35. *Soldanella minima*, Hoppe. — Zwerg-Alpenglöckchen.
Soldanelle minime. — Minime *Soldanella*.

Alpes calcaires orientales dans les zones supérieures. Juin — Juillet.



336. *Cyclamen europaeum*, L. — Erdscheibe.

Cyclame d'Europe. — Alpine Sowbread.

Pentes pierreuses des Alpes calcaires dans la région montagneuse. Juillet—Septembre.



337. *Gentiana Clusii* Perr. Song. — Clusius' Enzian.
Gentiane de Clusius. — Clusius's *Gentianella*.

Pâturages et pentes herbeuses des Alpes. Mai — Août.



338. *Gentiana Kochiana*, Perr. et Song. — Stengelloser Enzian.
Gentiane de Koch. — Gentianelle.

Pâturages et pentes herbeuses des Alpes granitiques. Juin — Juillet.



339. *Gentiana Froelichii*, Jan. — Fröhlich's Enzian.

Gentiane de Froelich. — Froelich's Gentian.

Rochers des zones élevées des Alpes orientales. Août — Septembre.



340. *Gentiana frigida*, Hänke. — Kälteliebender Enzian.
Gentiane des frimas. — Gentian of the cold region.

Alpes granitiques de la Styrie. Juillet — Août.



341. *Gentiana lutea*, L. — Gelber Enzian.

Gentiane jaune. — Yellow Gentian.

Montagnes calcaires. Juillet — Août



342. *Gentiana purpurea*, L. — Purpurrother Enzian.

Gentiane pourpre. — Brown Gentian.

Habitat : montagnes de la région alpine et sous alpine dans les Alpes centrales et tyroliennes. Juillet — Août.



343. *Gentiana punctata*, L. — Punktirter Enzian.
Gentiane ponctuée. — Dotted Gentian.

Pâturages des Alpes dans la région alpine et sous alpine. Juillet—Août.



344. *Gentiana pannonica*, Scop. - Pannonischer Enzian.
Gentiane de Hongrie. - Hungarian Gentian.

Pâturages des Alpes orientales dans la région alpine et sous alpine. Juillet - Septembre.



345. *Gentiana asclepiadea*, L. — Schwalbenwurz-Enzian.

Gentiane asclépiade — Willow Gentian.

Pentes boisées et humides de la région montagneuse. Août — Septembre.



346. *Gentiana prostrata*, Hänke. — Niedergestreckter Enzian.
Gentiane couchée. — Prostrate Gentian.

Gazons des Alpes orientales dans la région alpine. Juillet—Août.



347. *Gentiana utriculosa*, L. — Blasiger Enzian.

Gentiane à calice renflé. — Inflated Gentian.

Prairies humides des Alpes. Juin — Août.



348. *Gentiana nivalis*, L. — Schnee-Enzian.

Gentiane des neiges. — Snow Gentian.

Pentes gazonnées de la région alpine. Juillet — Août.



349. *Gentiana nana*, Wulf. — Zwergenzian.

Gentiane naine. — Dwarf-Gentian.

Moraines glaciaires supérieures des Alpes tyroliennes. Juillet—Août.



350. *Gentiana tenella* Rottb. — Zarter Enzian.

Gentiane grêle. — Tender Gentian.

Moraines et pentes des régions supérieures. Juillet—Août.



351. *Gentiana obtusifolia*, Willd. — Stumpfblättriger Enzian.
Gentiane aux feuilles obtuses. — Blunt-leaved Gentian.

Prairies et pâturages des Alpes orientales. Juin — Septembre.



352. *Gentiana ciliata*, L. — Gefranster Enzian.
Gentiane ciliée. — Ciliate Gentian.

Pentes arides de la région sous alpine et montagneuse. Septembre — Novembre.



353. *Gentiana verna*, L. — Frühlings-Enzian.
Gentiane printanière ou Oeil de Chat. — Vernal Gentian.
Prairies des Alpes. Mars — Juillet.



354. *Gentiana Favratii*, Bittener. — Kurzblättriger Enzian.

Gentiane de Favrat. — Favrat's Gentian.

Pentes rocheuses des Alpes calcaires, ici et là, dans la région alpine. Juin — Juillet.



355. *Gentiana imbricata*, Fröl. — Dachziegelblättriger Enzian.
 Gentiane à feuilles imbriquées. — Imbricateleaved Gentian.
 Pentes fraîches des Alpes orientales dans la zone supérieure. Juillet—Août.



146. *Gentiana bavarica*, L. — Baierischer Enzian.
Gentiane de Bavière. — Bavarian Gentian.



357. *Gentiana pumila*, Jacq. — Kleiner Enzian.

Gentiane pumile. — Pumile Gentian.

Pâturages et prairies de la région alpine dans les Alpes orientales. Juin — Août.



355. *Pleurogyne carinthiaca*, Griseb. — Transsilvane.

Pleurogyne. — *Pleurogyne*.

Alpes de Sans de Glaris et de la Carinthie dans les gazons frais de la région alpine et sous alpine.
Juillet — Août



359. *Swertia perennis*, L. — Tarant.

Swertie vivace. — Marsh *Swertia*.

Terrains tourbeux de la région sous alpine et montagneuse. Juillet — Août



360. *Polemonium coeruleum*, L. — Sperrkraut.

Polémoine. — Jacob's Ladder.

Prairies humides des Alpes orientales dans la région montagnarde et sous alpine. Juin—Juillet.



361. *Eritrichium nanum*, Schrad. — Himmelsherold.

Roi des Alpes. — King of the Alps.

Pierriers des hautes altitudes. Juillet—Août.



362. *Pulmonaria styriaca*, A. Kern. — Steierisches Lungenkraut.
Pulmonaire de Styrie. — Styrian Lungwort.

Région boisée des Alpes styriennes. Avril—Juin.



363. *Myosotis alpestris*, Schmidt. — Alpen-Vergissmeinnicht.

Myosotis des Alpes. Alpine Forget-me-not.

Prairies des Alpes. Juin — Septembre.



364. *Cerinthe alpina*, Kit. — Alpen-Wachsblume.
Mélinet des Alpes. Alpine Honeywort.

Pâturages rocheux de la région alpine. Juin—Août.



365. *Scopolia carniolica* Jacq. — Scopolie.
Scopoline. — Scopoline.

Pentes boisées des Alpes orientales. Avril—Mai.



366. *Linaria alpina*, Mill. — Alpenleinkraut.

Linaire des Alpes. — Alpine Toad-Flax.

Sables, moraines et pierriers des Alpes. Juin—Octobre.



367. *Scrophularia Hoppei*, Koch. — Hoppe's Braunwurz.

Scrofulaire de Hoppe. Hoppe's Figwort.

Eboulis rocheux de la région subalpine et montagneuse. Juin — Août.



368. *Digitalis ambigua*, Murr. — Gemeiner Fingerhut.

Digitale à grandes fleurs. — Largeflowered Foxglove.

Pentes rocheuses et boisées de la région sous alpine et montagneuse. Juin — Août



369. *Erinus alpinus*, L. — Leberbalsam.

Erine des Alpes. — Wall Erinus.

Rochers des Alpes calcaires. Juin — Août.



370. *Wulfenia carinthiaca*, Jacq. — Wulfenie.
Wulfénie. — Wulfenia.

Alpes de la Carinthie dans la région alpine. Juin — Août.



371. *Paederota Bonarota*, L. f. Manderle.

Bonerote blue. — Blue *Paederota*.

Lieux rocheux des Alpes du Tyrol méridional et de la Styrie. Juin — Juillet.



372. *Paedarota Ageria*, L. — Gelber Ehrenpreis.

Bonerote jaune. — Yellow *Paederota*.

Lieux rocheux des Alpes méridio-orientales. Juin — Août.



372. *Veronica saxatilis*, Jacq. — Blauer Felschrenpfeil.
 Véronique saxatile. — Saxatile speedwell.
 Lieux rocheux des Alpes. Juin—Août.



374. *Veronica fruticulosa*, L. — Rother Felsehrenpreis.

Véronique petit arbuste. — Shrublike Speedwell.

Lieux rocheux des Alpes. Juillet — Septembre.



375. *Veronica alpina*, L. — Alpenehrenpreis.

Véronique des Alpes. — Alpine Speedwell.

Région alpine et sous alpine dans les gazons. Juillet — Août.



376. *Veronica bellidioides*, L. — Maassliebchenblättriger Ehrenpreis.
 Véronique à feuilles de Pâquerettes. — Daisylike speedwell.
 Pâturages secs de la région alpine. Juillet—Août.



377. *Veronica aphylla*, L. — Stengelblattloser Ehrenpreis.
 Véronique aphyllé. — Aphyllé Speedwell.

Pentes rocheuses et herbeuses des hautes altitudes. Juillet — Août.



378. *Veronica latifolia*, L. — Breitblättriger Ehrenpreis.
Véronique à feuilles larges. — Broadleaved Speedwell.

Région montagnaise et boisée. Juin — Juillet.



379. *Euphrasia salisburgensis*, Funk. — Salzburgischer Angentrost
 Euphrase de Salzburg. — Eyebright of Salzburg.
 Prairies et pâturages des Alpes. Août — Septembre.



380. *Euphrasia minima*, Jacq. — Zwerg - Augentrost.
 Euphrase naine. — Dwarf Eyebright.

Pâturages des Alpes. Juillet—Septembre.



381. *Bartsia alpina*, L. — Alpenhelm.

Bartsie des Alpes. — Alpine Bartsia.

Prairies rocheuses et pentes arides de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.



382. *Rhinanthus lanceolatus*, Neilr. — *Alectorolophus-Rhinanthus*.
Cocriste lancéolé. — Lanceolate Rattle.

Prairies des régions inférieures. Juillet — Août.



383. *Pedicularis rosea*, Wulf. -- Rosenrothes Läusekraut.

Pédiculaire rose. — Pink Lousewort.

Alpes occidentales et orientales (rare) dans la région alpine et sous alpine. Juillet—Aout.



384. *Pedicularis acaulis*, Wulf. — Stengelloses Läusekraut.

Pédiculaire acaule. — Sessile flowered Lousewort.

Alpes méridio-orientales, dans les lieux ombragés de la région alpine et sous alpine. Août — Juin.



385. *Pedicularis geminata*, Port. — Blüthenarmes Läusekraut.

Pédiculaire géminée. — Fewflowered Lousewort.

Alpes orientales calcaires dans les pâturages et les escarpements rocheux de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.



386. *Pedicularis asplenifolia*, Floerke. — Streifenfarnblättriges
Läusekraut.
Pédiculaire à feuilles d'*Asplenium*. — *Asplenium* leaved Lousewort.
Alpes granitiques orientales dans la région alpine. Juillet — Août.



387. *Pedicularis rostrata*, L. — Geschnäbeltes Läusekraut.

Pédiculaire à bec crochu. — Crooked Lousewort.

Pentes herbeuses des régions supérieures dans les Alpes. Juillet — Août.



388. *Pedicularis caespitosa*, Sieb. — Rasenbildendes Läusekraut.
Pédiculaire cespiteuse. — Caespituous Lousewort.

Pâturages rocheux de la région alpine dans les Alpes orientales. Juillet — Août.



389. *Pedicularis incarnata*, Jacq. — Fleischrothes Läusekraut.

Pédiculaire incarnat. — Flesh coloured Lousewort.

Pâturages de la région alpine dans les Alpes orientales et centrales. Juin — Août.



390. *Pedicularis verticillata*, L. — Quirblättriges Läusekraut.
Pédiculaire en verticille. — Verticillated Lousewort.

Prairies fraîches des Alpes. Juin — Août.



391. *Pedicularis recutita*, L. — Ungeschnäbeltes Läusekraut.
Pédiculaire édentée. — Dissected Lousewort.

Prairies humides des Alpes. — Juillet—Août.



392. *Pedicularis Oederi*, Vahl. — Öder's Läusekraut.

Pédiculaire d'Oeder. — Oeder's Lousewort.

aux humides et rocheux des Alpes septentrionales, piémontaises et autrichiennes. Juillet — Août.





393. *Pedicularis elongata*, A. Kern. — Langtraubiges Läusekraut.
 Pédiculaire à grappe allongée. — Longearied Loosewort.
 Dolomites et pentes méridionales des Alpes orientales. Juillet — Août.



394. *Pedicularis foliosa*, L. — Blattreiches Läusekraut.

Pédiculaire feuillée. — Strongleaved Lousewort.

Escarpelements herbeux et frais de la région sous-alpine et montagneuse. Juin — Août.



395. *Melampyrum silvaticum*, L. — Wald-Wachtelweizen.
Mélampyre des forêts. — Wood's Cow Wheat.

Liens boisés et frais des Alpes. Juin — Août



396. *Tozzia alpina*, L. — Alpenrachen.

Tozzie des Alpes. — Alpine Tozzia.

Lièux frais et couverts de la région montagneuse et boisée. Juni — Août.



397. *Orobanche flava*, Mart. — Gelbe Sommerwurz.
Orobanche fauve. — Yellow Broom Rape.

Dans la région montagneuse sur les *Tussilages* et *Adenostyles*. Juin — Juillet.



398. *Pinguicula vulgaris*, L. — Gemeines Fetterkraut.
Grassète vulgaire. — Common Butterwort.
Rochers moussus et lieux humides des Alpes. Avril — Juin.



399. *Pinguicula alpina*, L. — Alpen-Fettkraut

Grassète des Alpes. — Alpine Butterwort.

Lieux humides de la région alpine et sous-alpine. Juin — Août.



400. *Globularia cordifolia*, L. — Herzblättrige Kugelblume.
 Globulaire à feuilles en coeur. — Heartleaved Globularia.

Pentes sèches et rocheuses des Alpes. Mai—Août.



New York Botanical Garden Library
QK 315 .C58 v.1 4
Correvon, Henry/Atlas de la flora alpine



3 5185 00108 2484

